



A.O. S. Croce e Carle  
Cuneo

MOD<sub>ORL</sub>\_003

**NOTA INFORMATIVA**

**INTERVENTO CHIRURGICO DI ADENOTONSILLECTOMIA**

Data prima emissione: 23/06/2023

Data ultima revisione: 23/06/2023  
Revisione n. 00

**Etichetta**

Nome:

Cognome:

Data di Nascita:

Fornite da \_\_\_\_\_

Gentile Signor/a \_\_\_\_\_

(se il paziente non ha diritto o capacità di esprimere autonomamente il consenso, compilare le voci sottostanti)

Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di: ☐ padre ☐ madre ☐ legale rappresentante

di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Suo/a figlio/a o persona di cui ha tutela dovrà essere sottoposto/a ad intervento di **ADENOTONSILLECTOMIA** perché è affetto/a da

- ☐ Infiammazioni ricorrenti / infiammazione cronica
- ☐ Ipertrofia di adenoidi e tonsille con sindrome da apnea ostruttiva notturna

Scopo del presente foglio informativo è quello di puntualizzare alcuni aspetti importanti dell'intervento chirurgico cui verrà sottoposto/a suo/a figlio/a. La comprensione di tali aspetti è indispensabile perché lei possa esprimere al proposito un "consenso informato", cioè l'accettazione che suo/a figlio/a sia sottoposto/a all'intervento, dopo aver potuto adeguatamente riflettere sui vantaggi e sui rischi correlati all'intervento stesso. Le informazioni contenute in questo foglio servono ad integrare quelle che Le sono già state fornite dallo specialista inviante ed a illustrare i punti più importanti del trattamento che Le è stato proposto. È evidente che per qualsiasi aspetto che non Le risulti sufficientemente chiaro è Suo diritto domandare ulteriori spiegazioni e precisazioni al medico operatore che sarà ben lieto di fornirle. La preghiamo, pertanto, di leggere con attenzione questo documento: tenga presente che le informazioni che vi sono contenute non hanno lo scopo di procurarLe delle preoccupazioni, ma hanno il solo scopo di consentirLe di decidere in modo libero e chiaro (e quindi meglio e più consapevolmente) se suo/a figlio/a possa sottoporsi o meno all'intervento.

È importante:

- che riferisca al Chirurgo di riferimento, ai medici che redigeranno la Sua cartella clinica ed all'anestesista i farmaci di cui fa abitualmente uso suo/a figlio/a (in particolare analgesici, antinfiammatori, antidolorifici, ipotensivi, cardiologici, anticoagulanti, etc.);
- che riferisca se suo figlio/a ha già presentato delle manifestazioni allergiche, soprattutto nei confronti di farmaci e se ha ben tollerato eventuali precedenti anestesie. Infine è bene che porti tutta la documentazione clinica in Suo possesso (analisi o indagini cliniche, esami radiologici, etc.);
- che porti tutta la documentazione clinica in Suo possesso (analisi o indagini cliniche, esami radiologici, etc.).

**Finalità dell'intervento**

Lo scopo dell'intervento è quello di asportare contemporaneamente sia il tessuto linfatico situato a livello del rinofaringe (parte della faringe in comunicazione con le cavità nasali), sia le tonsille palatine.

L'asportazione delle tonsille palatine e delle adenoidi è giustificata quando coesistono una o più situazioni patologiche dovute alle prime, cioè:

- vanno soggette ad infezioni ricorrenti



A.O. S. Croce e Carle  
Cuneo

**MOD<sub>ORL</sub>\_003**

**NOTA INFORMATIVA**

**INTERVENTO CHIRURGICO DI ADENOTONSILLECTOMIA**

Data prima emissione: 23/06/2023

Data ultima revisione: 23/06/2023  
Revisione n. 00

- hanno un volume tale da dare luogo a disturbi della deglutizione o della respirazione, il più grave dei quali è la sindrome da apnea ostruttiva notturna (disturbo della respirazione caratterizzato dall' ostruzione parziale prolungata e/o completa ma intermittente delle alte vie aeree, apnee ostruttive, che interrompono la normale ventilazione durante il sonno)
- sono responsabili di complicanze infettive
- hanno determinato o possono determinare malattie a distanza (in altri organi)

### **Realizzazione dell'intervento**

L'intervento viene eseguito abitualmente in anestesia generale. È indispensabile, pertanto, la valutazione anestesiológica preoperatoria. Il medico anestesista rianimatore risponderà a tutte le Sue domande relative alla propria specializzazione. L'intervento viene effettuato con strumenti introdotti dalla bocca. L'asportazione delle adenoidi, pur essendo quasi completa, non è mai totale per non correre il rischio di provocare lesioni alla tuba di Eustachio (il condotto che fa comunicare l'orecchio medio con l'esterno permettendone il drenaggio delle secrezioni e l'aerazione). Dopo l'intervento di asportazione delle tonsille palatine in particolare persistono sui lati della bocca, una per ciascun lato, due ferite aperte che impiegano dai quindici ai venti giorni per guarire. Queste ferite si ricoprono di una patina biancastra (escara) che non deve essere assolutamente asportata. La deglutizione sarà dolorosa come in una forte faringite, soprattutto fra la terza e la sesta giornata postoperatoria. L'alimentazione sarà inizialmente liquida e poi, gradualmente, semiliquida fino a tornare normale in seconda settimana. Farmaci contro il dolore potranno essere prescritti solo dal chirurgo operatore. La durata del ricovero ospedaliero e le cure postoperatorie Le saranno precisate dal Chirurgo di riferimento.

Come tutti gli atti medici (esami, endoscopie, interventi sul corpo umano) che, pur se condotti in maniera adeguata con competenza ed esperienza, in conformità agli attuali standard di scienza e di norme in vigore, anche l'intervento di adenotonsillectomia può comportare dei rischi di complicanze.

### **Rischi di Complicanze**

I rischi di complicanze sono:

- emorragia (sanguinamento) precoce: intra-operatoria o post-operatoria (dalla terza-quarta ora fino a 1 giorno) per sanguinamento di vasi che possono avere calibro o decorso anomalo;
- emorragia tardiva in quinta - dodicesima giornata è un evento raro. Richiede un trattamento immediato; qualsiasi sanguinamento, anche minimo, deve essere segnalato al chirurgo operatore
- un'emorragia massiva è di norma eccezionale e può necessitare di una emostasi locale o, anche, di un'operazione sul collo da eseguire in anestesia generale
- durante l'intervento si può verificare un'inalazione di sangue, a cui può seguire un'infezione broncopolmonare che dovrà essere trattata con appositi farmaci
- a causa degli strumenti utilizzati per eseguire l'intervento chirurgico si possono verificare piccole lesioni della lingua o del labbro, che guariscono rapidamente, oppure mobilizzazione o caduta di elementi dentari
- si possono verificare, anche se molto raramente, episodi infettivi del rinofaringe od un'otite acuta
- sindrome di Grisel: molto rara, consiste nella sub-lussazione dell'articolazione atlanto-assiale conseguente all'iperestensione del capo, con immediato dolore cervicale (del collo) post-operatorio e torcicollo
- enfisema sottocutaneo: diffusione di aria al di sotto della cute, dovuta alla lesione accidentale dei muscoli del piano profondo della loggia tonsillare con crepitio alla palpazione e, raramente, difficoltà respiratoria; in genere si riassorbe in uno o due giorni. Si può verificare, anche se molto raramente, un'infezione cervicale tipo adenoflemmone o flemmone laterocervicale. La sua sintomatologia è data da febbre elevata, dolori cervicali e rigonfiamento del collo. Richiede una visita immediata del Chirurgo di riferimento
- otalgia riflessa che generalmente raggiunge il culmine fra la terza e la sesta/settima giornata postoperatoria, ma non è grave e di norma non richiede trattamento alcuno
- modificazione della voce: rara, consiste nella modificazione del timbro della voce con risonanza nasale aumentata (rinolalia aperta), dovuta ad ipomotilità del velo palatino dopo la cicatrizzazione; in alcuni casi può essere necessaria una riabilitazione logopedica



A.O. S. Croce e Carle  
Cuneo

**MOD<sub>ORL</sub>\_003**

**NOTA INFORMATIVA**

**INTERVENTO CHIRURGICO DI ADENOTONSILLECTOMIA**

Data prima emissione: 23/06/2023

Data ultima revisione: 23/06/2023  
Revisione n. 00

- reflusso di liquidi dal naso durante la deglutizione: è dovuta ad asportazione di uno od entrambi pilastri posteriori delle tonsille palatine; in genere questa si riduce o scompare del tutto nel giro di qualche settimana; in alcuni casi può essere necessaria una terapia riabilitativa
- perforazioni di uno o entrambi i pilastri tonsillari: visibili all'ispezione del cavo orale ma di scarsa rilevanza clinica
- recidiva delle vegetazioni adenoidee: evento abbastanza frequente, soprattutto in bambini molto piccoli o con tendenza all'ipertrofia e/o iperplasia del tessuto linfoide
- faringite cronica: infiammazione cronica della gola legata alla mancanza della funzione di difesa svolta normalmente dalle tonsille a livello dell'istmo delle fauci
- complicanze anestesilogiche: legate ai rischi dell'anestesia generale/locale, con possibili complicanze anche molto gravi come lo shock anafilattico.

#### **Nel corso dei colloqui orali mi sono stati spiegati**

- la natura dell'intervento e la sua indicazione per la mia patologia in atto;
- la portata dei benefici ottenibili e la possibilità di ottenerli in relazione alla casistica generale ed alla mia personale condizione, con la precisazione che potrebbero rendersi necessarie revisioni per eventuali difetti, anche di natura estetica, non sempre imputabili ad errori di esecuzione tecnica;
- i rischi prevedibili dell'intervento, in relazione alla casistica generale ed alla mia personale condizione, con la precisazione che comunque ogni intervento chirurgico può comportare rischi imprevedibili;
- la possibilità di scelte alternative, con spiegazione dei relativi benefici e rischi;
- il prevedibile periodo di ricovero e di convalescenza (salvo complicazioni) e le precauzioni postoperatorie indicate per evitare complicazioni, salvo quanto verrà più precisamente prescritto dopo l'intervento e nei successivi controlli.

Nel corso dei colloqui ho chiesto ed ottenuto i chiarimenti desiderati sui vari punti oggetto delle informazioni datemi. Al termine mi è stato consegnato il prospetto scritto che precede ed integra le dette informazioni, con la raccomandazione di riconsiderarle attentamente, esprimere liberamente eventuali dubbi e quesiti ulteriori, riguardanti anche la comprensione dei singoli termini, e dichiarare infine se alla luce di tutto quanto sopra io ritenga di manifestare o meno il mio consenso all'intervento proposto.

Dichiaro pertanto di essere stato/a informato/a dei rischi connessi all'intervento, che è stata soddisfatta ogni mia ulteriore richiesta di informazione, di aver ben compreso in ogni loro parte le informazioni ricevute e di aver avuto il tempo necessario per riflettere.

Ciò premesso:

**Dichiaro di ricevere/aver ricevuto copia del presente documento, che in ogni caso è disponibile online nella pagina Internet dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo ([www.ospedale.cuneo.it](http://www.ospedale.cuneo.it)), nella sezione Home / Reparti Servizi Ambulatori, nella pagina dell'Otorinolaringoiatria**

Firma del medico che fornisce le informazioni \_\_\_\_\_

Firma del genitore/legale rappresentante che riceve le informazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_