

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo SC Medicina Nucleare	TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) STUDIO QUALITATIVO FDG	Data ultima revisione: 07/07/2017 Revisione n. 0 Pagina 1 di 1
--	--	---

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Preparazione

È richiesto il digiuno nelle 6 ore antecedenti l'orario attribuito in fase di prenotazione. In pratica se l'esame è prenotato entro le 12 il paziente non deve assumere cibi o alcolici dopo la mezzanotte e fare una cena leggera la sera precedente l'esame; se l'esame è programmato dopo le 12 il paziente può fare una colazione leggera almeno 6 ore prima evitando l'uso di alimenti ricchi di zuccheri. Se il paziente sta effettuando nutrizione parenterale questa deve essere sospesa 6 ore prima dell'esame. Nelle ore precedenti l'esame il paziente è invitato a bere acqua (almeno 1 litro).

Il paziente dovrà presentarsi in Medicina Nucleare con una bottiglia da un litro di acqua minerale.

Il paziente può mantenere la sua normale terapia (ad esempio farmaci antiipertensivi, ANS, antibiotici, antidolorifici, etc).

Pazienti diabetici in terapia con ipoglicemizzanti orali

Al paziente viene attribuito appuntamento per eseguire la PET-CT in tarda mattinata: dovrà effettuare una colazione non abbondante 6 ore prima dell'appuntamento assumendo contestualmente l'ipoglicemizzante orale, mantenendo poi rigorosamente il digiuno; è raccomandata idratazione come sopra descritto.

Pazienti diabetici in terapia con insulina

Al paziente viene attribuito appuntamento per eseguire la PET-CT in tarda mattinata: dovrà effettuare una colazione non abbondante 6 ore prima dell'appuntamento assumendo contestualmente le unità di insulina previste dal suo normale schema di trattamento. Al paziente deve essere chiesto che tipo di schema di terapia insulinica assume per accertarsi che lì insulina del mattino non sia del tipo "long-acting". Il paziente è invitato a portare con sé l'insulina che utilizza abitualmente.

Sospensione di terapia medica

Il paziente può assumere regolarmente tutta la terapia eventualmente prescritta dal medico (ad esempio farmaci anti-ipertensivi, FANS, antibiotici, antidolorifici, etc) ad eccezione degli steroidi, che devono essere sospesi la mattina prima dell'esecuzione dell'esame.



Il non corretto mantenimento del digiuno nelle 6 ore antecedenti l'esame o la non osservanza di quanto sopra riportato per i pazienti diabetici può essere ragione di differimento dell'esame ad altra data.